

※ 이 약을 복용하시기 전에 사용설명서를 자세히 읽어 주시고, 의약품과 함께 보관하여 주십시오.
※ 의약품을 처방된 증상환자 이외에는 사용하지 말고, 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

알파파워정

육체피로·체력저하

(일반의약품)

비타민 A, D, B1, B2

육체피로, 임신·수유기, 병후의 체력저하, 신경통, 근육통, 관절통, 각기, 눈의피로

원료약품 및 분량 1정 중

[유효성분]

• 레티놀아세테이트 과립(EP) (비타민A로서 1,500IU)	3mg
• 푸르설타이민염산염(KP) (푸르설타이민으로서 12,5mg)	13.7mg
• 리보플라빈(KP)	4mg
• 니코틴아이드(KP)	30mg
• 농축콜레칼시페롤(EP) (비타민D로서 150IU)	1.5mg
• 산화마이연(KP) (아연으로서 8mg)	10mg
• 산화마그네슘(KP) (마그네슘으로서 50mg)	82.5mg

[동물유래성분] 레티놀아세테이트 과립(소, 젤라틴), 농축콜레칼시페롤(소, 젤라틴)

[첨가제(타르색소)] 적색4호알루미늄레이크, 청색1호알루미늄레이크, 황색5호(산색엘로우FCF)알루미늄레이크

[기타첨가제] 경질무수규산, 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아란산, 저치환도히드록시프로필세룰로오스, 크로스카멜로오스나트륨, 탤클, 탤唬드클리어92C569, 폴리에틸렌글리콜6000, 히프로멜로오스

성상 : 보라색의 원형 필름코팅정

효능·효과 :

1. 다음경우의 비타민 A, D, B1, B2의 보급

- 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하, 발육기, 노년기

- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.

· 눈의 건조감의 완화 · 아랫증(밤에 잘 못보는 증상) · 뼈, 이의 발육불량 · 구루병의 예방 · 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등) · 각기 · 눈의피로

2. 이연의 보급

용법·용량 :

• 만 12세 이상 및 성인 : 1일 1회, 2정씩 복용

사용상의 주의사항

1. 경고

1) 임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A를 5,000IU/일 이상 투여하지 말 것.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 고칼슘혈증(hypercalciumia) : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육증증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자

2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에過민반응이 있는 환자

3) 만 12개월 미만의 젖먹이

4) 신장결석 환자

5) 심한 증상의 신부전 환자

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

인산염, 칼슘염, 경구용 티트리사이클린계 제제, 제산제

4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 이 약은 흥색속(호선색)으로 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것

2) 의사의 치료를 받고 있는 환자

3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아

① 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경증 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생) 증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A 결핍증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다.

② 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.

4) 신장장애 환자 5) 저단백혈증 환자 6) 신장결석 병력이 있는 환자 7) 임부

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 :

구역, 구토, 기력운, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종, 설사, 묽은 변, 구내염(입안염), 식욕부진, 복부팽만감, 뚱은 반점, 부전수족(상반동정지), 중추신경계 기능저하, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종

2) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당나성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대시하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.

3) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.

4) 장기간 고용량의 비타민 A(베타카로틴으로부터 전환된 것을 제외한) 섭취는 폐경기를 지난 여성의 골다공증(뼈영성증) 위험을 높일 수 있다.

5) 우발적으로 과량복용 한 경우

6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

2) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000IU 이상을 넘지 않도록 한다.

3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.

4) 녹차, 흙차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용진후에는 피할 것.

7. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것

3) 오용·잘못 사용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

포장단위 : 2정/포일, 300정/상자(2정/포일*150), 600정/상자(2정/포일*300)

사용기간 : 제조일로부터 36개월

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한(유효기간)이 경과되었거나 변질변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 의약품의 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr)을 참조하세요.

※ 내용 외 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전처로 연락하시고, 부작용 보고 및 피해구제신청은 한국의약품 안전관리원(1644-6223) 및 피해구제 제도 전용 상담번호(14-3330)에서 할 수 있습니다.

※ 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 www.chodang.com 또는 전화 02-2206-3800에서 확인할 수 있습니다.

소비자 상담전화 : 080-302-3000(수신자 부담)

제조판매자 : 초당약품공업(주) 경기도 안산시 단원구 별망로 381 www.chodang.com

문서작성년월일: 2022. 08. 01