

※ 이 약을 복용하시기 전에 사용설명서를 자세히 읽어 주시고, 의약품과 함께 보관하여 주십시오.
※ 의약품을 처방된 증상환자 이외에는 사용하지 말고, 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

에스알파정

MMSC (양배추 유래성분) / 자소엽건조엑스 / 리파제AP12
메틸메티오닌설포늄염화물

일반의약품

위부불쾌감, 위부팽만감, 위통, 위산과다, 속쓰림, 신트림, 과식, 체함, 소화불량, 소화촉진, 식욕부진, 구역, 구토

원료약품 및 분량 1정(606mg) 중

유효성분

- 메틸메티오닌설포늄염화물(KP) 25mg
- 스코폴리아엑스3배산(별규) 15mg
(히오스시아민(아트로핀)(으로서 0.043mg))
- 당약 가루(UP) 5mg
(스웨르티아마린(으로서 0.23mg))
- 비오디아스타제2000(별규) 4mg
(전분당화력 60~80단위, 전분호정화력 120~168단위)
(단백소화력(pH3.0) 38~68 단위, 단백소화력(pH6.0) 88~160단위)
(단백소화력(pH8.0) 68~136단위, 섬유소 당화력 0.48~0.8단위)
- 리파제AP12(별규) 2.5mg
(지방소화력(pH6.0) 50~65단위)
- 자소엽건조엑스(7.8~9.5-1)(별규) 5mg
- 탄산마그네슘(KP) 41.6667mg
(산화마그네슘(으로서 17.50mg))
- 탄산수소나트륨(KP) 116.6667mg
- 침강탄산칼슘(KP) 200mg

첨가제

경질무수규산, 경회유, 계피가루, 미결정셀룰로오스, 셀락, 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 저지함도히드록시프로필셀룰로오스, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 탭크, 포비돈K30, 폴리비닐알코올, 폴리옥실40스테아레이트, 히드록시프로필셀룰로오스, L-멘톨

성 상 : 담황갈색의 원형 유행정

효능·효과 :

위부불쾌감, 위부팽만감, 위통, 위산과다, 속쓰림, 신트림, 과식, 체함, 소화불량, 소화촉진, 식욕부진, 구역, 구토

용법·용량 :

- 성인(15세 이상): 1회 2정 1일 3회 식후 복용
- 8세 이상 ~ 15세 미만: 1회 1정 1일 3회 식후 복용

사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
만 7세 이하의 어린이
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것
1) 위장진통·진경(경련완화)제
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것
수유중인 사람은 이 약을 복용하지 말거나 이 약을 복용하는 경우에는 수유를 피할 것(모유로 이행하여 유아의 맥(맥박)이 빨라질 수 있다.)

- 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
1) 의사의 치료를 받고 있는 사람
2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
3) 위장관(창자질환 환자, 신장 장애 환자, 심장 장애 환자, 녹내장(눈의 통증, 눈의 침침함 등) 또는 배뇨(소변을 놓)장애 환자, 갑상선 기능장애 환자 또는 고령자(노인))
4) 고마그네슘혈증 환자
5) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
6) 약으로 알레르기 증상(발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움 등)을 일으킨 적이 있는 사람
7) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
- 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 이 첨부문서를 소지할 것.
1) 이 약을 복용하는 동안 다음의 증상이 나타난 경우: 알레르기 증상(발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움 등), 입이 마름, 변비 또는 설사의 증상, 두통, 안면홍조, 눈부심, 배뇨장애
2) 2주일 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜질 것
2) 어린이 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 투여할 것
3) 다량의 우유, 칼슘제와 병용시 우유 알칼리 증후군(고칼슘혈증, 고질소혈증, 알칼리증 등)이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지할 것
4) 이 약의 복용으로 인하여 모유의 분비가 힘들어질 수 있다.
5) 이 약에는 메틸메티오닌설포늄염화물 등이 배합되어 있어 특유의 냄새가 있다.
- 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것
2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것
3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것
4) 수분이 정제에 닿으면 성분 변화의 원인이 되므로, 물을 떨어뜨리거나 젖은 손으로 만지지 말 것. 잘못하여 정제가 젖은 경우에는 젖은 정제를 폐기할 것
5) 용기 속에 채워 넣은 비닐은 운송 중에 정제의 손상을 방지하기 위한 것이므로 개봉 후에는 버릴 것 (병 용기에 한함)
6) 용기의 뚜껑이 완전히 닫히지 않은 경우, 습기 등에 의하여 품질에 영향을 줄 수 있으므로 복용 후 반드시 뚜껑을 잘 닫을 것(병 용기에 한함)
7) 사용기한이 지난 제품은 복용하지 말 것

저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 어린이의 손이 닿지 않게 보관하십시오.

포장단위 : 180정/상자(60정/병X3), 36정/상자(18정/PTPX2), 2정/포일, 600정/상자(2정/포일X300)

사용기한 : 제조일로부터 36개월

- ※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 펼 한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한(유효기간)이 경과되었거나 변질변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 의약품의 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(hedrug.mfds.go.kr)을 참조하세요.
- ※ 내용 외 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전처로 연락하시고 부작용 피해 구제 신청은 한국의약품안전관리원에서 할 수 있습니다.
- ※ 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 www.chodang.com 또는 전화 02-2206-3800에서 확인할 수 있습니다.

소비자 상담전화 : 080-302-3000 (수신자 부담)

부작용 보고 : 한국의약품안전관리원 (1644-6223)

제조판매자 : 초당약품공업(주) 경기도 안산시 단원구 별망로 381 www.chodang.com