

* 의약품을 사용하시기 전에 주의깊게 읽도록 하시고 설명서는 의약품과 함께 보관하여 주십시오.
* 의약품을 처방된 증상 환자 이외에는 사용하지 말고, 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

렉시탈® 정 10mg (에스시탈로프람옥살산염)

전문의약품

[원료약물의 분량] 1정(128mg) 중
· 유효성분: 에스시탈로프람옥살산염(USP) 12.77mg(에스시탈로프람으로서 10mg)
· 기타첨가제: 미경정셀룰로스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이인색(03B28796), 쿠로이드성 이산화규소, 크로스포비돈, 텔크

[성상] 흰색의 타원형 필름코팅 정제

[효능 · 효과] 주요우울장애, 광장증포증을 수반하거나 수반하지 않는 공황장애, 사회불안장애(사회공포증), 범별안장애, 강박장애의 치료

[용법 · 용량] 1일 20mg으로 초과하는 용량에 대해서는 증상이 확립되어 있지 않다.

이 약은 1일 1회 아침이나 저녁에 식사와 함께 섭취되어 투여한다.

1) 성인

(1) 주요우울장애: 상용량으로 1일 1회 10mg을 투여한다. 환자의 반응에 따라 1일 최대 20mg까지 증강할 수 있다. 이 약의 용량을 20mg으로 증강하고자 할 경우, 최소 1주 이상의 간격을 두고 증강하여야 한다. 일반적으로 항우울제의 효과와 발현에는 2~4주가 필요하다. 증상이 소실된 후에도 치료 투여를 확실히 하기 위하여 최소 6개월의 약물치료가 필요하다.

(2) 광장증포증을 수반하거나 수반하지 않는 공황장애: 조용성포증으로 1일 5mg를 주간 투여한 후 1일 10mg으로 증강하는 것이 권장된다. 환자의 반응에 따라 1일 최대 20mg까지 증강할 수 있다. 최대 투여는 약 3개월 후에 나타난 광장증의 치료로서 이 약의 10주 이상의 초기 간격과 함께 안전性和 유호성에 대해서는 제제적으로 연구되지 않았다. 의사는 각각의 환자들로 주기적으로 재평가하여 지속적인 치료의 필요성을 결정해야 한다.

(3) 사회불안장애: 상용량으로 1일 10mg을 투여한다. 일반적으로 증상의 개선을 위해서 2~4주가 필요하다. 그 이후에 환자의 반응에 따라 1일 5mg로 감량하거나 1일 최대 20mg으로 증강할 수 있다. 사회불안장애는 만성적 경과를 보이며, 호흡 곤란, 허기, 하기 위해 12주 동안 치료를 기록하는 것이 권장된다. 반응을 보이는 환자들에 대한 경기치료는 6개월간 연구되었으며 재활을 예상하기 위해 개개의 환자를 별도로 고려된다. 장기치료의 유익성에 대해서 재평가하여 한다.

사회불안장애는 특정 경과에 대한 잘 구조된 진단을 이용하여, 도록 한 수단을 찾는 환자를 위해서는 사회불안장애가 유의하여 직업 및 사회 활동을 방해하는 경우에 한해 실시한다. 약물치료는 사회불안장애가 전체적인 치료의 일부부분이다.

(4) 범별안장애: 초기용량으로 1회 10mg을 투여한다. 환자의 반응에 따라 최소 1주간 투여 후 1일 최대 20mg까지 증강할 수 있다.

12주 동안 치료를 기록하는 경우에 시도된다. 의사는 각각의 환자들에 있어서 이 약의 경기치료의 유익성을 예상하여 재활을 예상하기 위해 개개의 환자를 별도로 고려된다.

(5) 강박장애: 상용량으로 1일 10mg을 투여하는 경우의 반응에 따라 1일 최대 20mg으로 증강할 수 있다. 16주 광개투여에 반응을 보이는 환자들에 대해서 2주마다 1일 10mg 또는 20mg를 투여한 경기 투여 시점이 실시되었다. 강박증은 만성화되어 증상의 회복을 확인할 수 있도록 충분한 기간 동안 투여해야 하며, 이 약을 장기 투여할 경우에는 개개 환자에 대한 유용성과 전반적인 치료의 일부부분이다.

(6) 광장증과 함께: 초기용량으로 1회 10mg을 투여한다. 환자의 반응에 따라 최소 1주간 투여 후 1일 최대 20mg까지 증강할 수 있다.

12주 동안 치료를 기록하는 경우에 시도된다. 의사는 각각의 환자들에 있어서 이 약의 경기치료의 유익성을 예상하여 재활을 예상하기 위해 개개의 환자를 별도로 고려된다.

(7) 경기증: 주요우울증과 함께: 초기용량으로 1회 10mg을 투여하는 경우의 반응에 따라 1일 최대 20mg으로 증강할 수 있다. 16주 광개투여에 반응을 보이는 환자들에 대해서 2주마다 1일 10mg 또는 20mg를 투여한 경기 투여 시점이 실시되었다. 강박증은 만성화되어 증상의 회복을 확인할 수 있도록 충분한 기간 동안 투여해야 하며, 이 약을 장기 투여할 경우에는 개개 환자에 대한 유용성과 전반적인 치료의 일부부분이다.

(8) 범별안증과 함께: 초기용량으로 1회 10mg을 투여한다. 환자의 반응에 따라 최소 1주간 투여 후 1일 최대 20mg까지 증강할 수 있다.

12주 동안 치료를 기록하는 경우에 시도된다. 의사는 각각의 환자들에 있어서 이 약의 경기치료의 유익성을 예상하여 재활을 예상하기 위해 개개의 환자를 별도로 고려된다.

(9) 경기증과 함께: 초기용량으로 1회 10mg을 투여하는 경우의 반응에 따라 최소 1주간 투여 후 1일 최대 20mg까지 증강할 수 있다.

12주 동안 치료를 기록하는 경우에 시도된다. 의사는 각각의 환자들에 있어서 이 약의 경기치료의 유익성을 예상하여 재활을 예상하기 위해 개개의 환자를 별도로 고려된다.

(10) 경기증과 함께: 초기용량으로 1회 10mg을 투여하는 경우의 반응에 따라 1일 최대 20mg으로 증강할 수 있다. 16주 광개투여에 반응을 보이는 환자들에 대해서 2주마다 1일 10mg 또는 20mg를 투여한 경기 투여 시점이 실시되었다. 강박증은 만성화되어 증상의 회복을 확인할 수 있도록 충분한 기간 동안 투여해야 하며, 이 약을 장기 투여할 경우에는 개개 환자에 대한 유용성과 전반적인 치료의 일부부분이다.

(11) 경기증과 함께: 초기용량으로 1회 10mg을 투여하는 경우의 반응에 따라 최소 1주간 투여 후 1일 최대 20mg까지 증강할 수 있다.

12주 동안 치료를 기록하는 경우에 시도된다. 의사는 각각의 환자들에 있어서 이 약의 경기치료의 유익성을 예상하여 재활을 예상하기 위해 개개의 환자를 별도로 고려된다.

(12) 경기증과 함께: 초기용량으로 1회 10mg을 투여하는 경우의 반응에 따라 1일 최대 20mg으로 증강할 수 있다.

12주 동안 치료를 기록하는 경우에 시도된다. 의사는 각각의 환자들에 있어서 이 약의 경기치료의 유익성을 예상하여 재활을 예상하기 위해 개개의 환자를 별도로 고려된다.

(13) 경기증과 함께: 초기용량으로 1회 10mg을 투여하는 경우의 반응에 따라 1일 최대 20mg으로 증강할 수 있다.

12주 동안 치료를 기록하는 경우에 시도된다. 의사는 각각의 환자들에 있어서 이 약의 경기치료의 유익성을 예상하여 재활을 예상하기 위해 개개의 환자를 별도로 고려된다.

(14) 경기증과 함께: 초기용량으로 1회 10mg을 투여하는 경우의 반응에 따라 1일 최대 20mg으로 증강할 수 있다.

12주 동안 치료를 기록하는 경우에 시도된다. 의사는 각각의 환자들에 있어서 이 약의 경기치료의 유익성을 예상하여 재활을 예상하기 위해 개개의 환자를 별도로 고려된다.

(15) 경기증과 함께: 초기용량으로 1회 10mg을 투여하는 경우의 반응에 따라 1일 최대 20mg으로 증강할 수 있다.

12주 동안 치료를 기록하는 경우에 시도된다. 의사는 각각의 환자들에 있어서 이 약의 경기치료의 유익성을 예상하여 재활을 예상하기 위해 개개의 환자를 별도로 고려된다.

(16) 경기증과 함께: 초기용량으로 1회 10mg을 투여하는 경우의 반응에 따라 1일 최대 20mg으로 증강할 수 있다.

12주 동안 치료를 기록하는 경우에 시도된다. 의사는 각각의 환자들에 있어서 이 약의 경기치료의 유익성을 예상하여 재활을 예상하기 위해 개개의 환자를 별도로 고려된다.

(17) 경기증과 함께: 초기용량으로 1회 10mg을 투여하는 경우의 반응에 따라 1일 최대 20mg으로 증강할 수 있다.

12주 동안 치료를 기록하는 경우에 시도된다. 의사는 각각의 환자들에 있어서 이 약의 경기치료의 유익성을 예상하여 재활을 예상하기 위해 개개의 환자를 별도로 고려된다.

(18) 경기증과 함께: 초기용량으로 1회 10mg을 투여하는 경우의 반응에 따라 1일 최대 20mg으로 증강할 수 있다.

12주 동안 치료를 기록하는 경우에 시도된다. 의사는 각각의 환자들에 있어서 이 약의 경기치료의 유익성을 예상하여 재활을 예상하기 위해 개개의 환자를 별도로 고려된다.

(19) 경기증과 함께: 초기용량으로 1회 10mg을 투여하는 경우의 반응에 따라 1일 최대 20mg으로 증강할 수 있다.

12주 동안 치료를 기록하는 경우에 시도된다. 의사는 각각의 환자들에 있어서 이 약의 경기치료의 유익성을 예상하여 재활을 예상하기 위해 개개의 환자를 별도로 고려된다.

(20) 경기증과 함께: 초기용량으로 1회 10mg을 투여하는 경우의 반응에 따라 1일 최대 20mg으로 증강할 수 있다.

12주 동안 치료를 기록하는 경우에 시도된다. 의사는 각각의 환자들에 있어서 이 약의 경기치료의 유익성을 예상하여 재활을 예상하기 위해 개개의 환자를 별도로 고려된다.

(21) 경기증과 함께: 초기용량으로 1회 10mg을 투여하는 경우의 반응에 따라 1일 최대 20mg으로 증강할 수 있다.

12주 동안 치료를 기록하는 경우에 시도된다. 의사는 각각의 환자들에 있어서 이 약의 경기치료의 유익성을 예상하여 재활을 예상하기 위해 개개의 환자를 별도로 고려된다.

(22) 경기증과 함께: 초기용량으로 1회 10mg을 투여하는 경우의 반응에 따라 1일 최대 20mg으로 증강할 수 있다.

12주 동안 치료를 기록하는 경우에 시도된다. 의사는 각각의 환자들에 있어서 이 약의 경기치료의 유익성을 예상하여 재활을 예상하기 위해 개개의 환자를 별도로 고려된다.

(23) 경기증과 함께: 초기용량으로 1회 10mg을 투여하는 경우의 반응에 따라 1일 최대 20mg으로 증강할 수 있다.

12주 동안 치료를 기록하는 경우에 시도된다. 의사는 각각의 환자들에 있어서 이 약의 경기치료의 유익성을 예상하여 재활을 예상하기 위해 개개의 환자를 별도로 고려된다.

(24) 경기증과 함께: 초기용량으로 1회 10mg을 투여하는 경우의 반응에 따라 1일 최대 20mg으로 증강할 수 있다.

12주 동안 치료를 기록하는 경우에 시도된다. 의사는 각각의 환자들에 있어서 이 약의 경기치료의 유익성을 예상하여 재활을 예상하기 위해 개개의 환자를 별도로 고려된다.

(25) 경기증과 함께: 초기용량으로 1회 10mg을 투여하는 경우의 반응에 따라 1일 최대 20mg으로 증강할 수 있다.

12주 동안 치료를 기록하는 경우에 시도된다. 의사는 각각의 환자들에 있어서 이 약의 경기치료의 유익성을 예상하여 재활을 예상하기 위해 개개의 환자를 별도로 고려된다.

(26) 경기증과 함께: 초기용량으로 1회 10mg을 투여하는 경우의 반응에 따라 1일 최대 20mg으로 증강할 수 있다.

12주 동안 치료를 기록하는 경우에 시도된다. 의사는 각각의 환자들에 있어서 이 약의 경기치료의 유익성을 예상하여 재활을 예상하기 위해 개개의 환자를 별도로 고려된다.

(27) 경기증과 함께: 초기용량으로 1회 10mg을 투여하는 경우의 반응에 따라 1일 최대 20mg으로 증강할 수 있다.

12주 동안 치료를 기록하는 경우에 시도된다. 의사는 각각의 환자들에 있어서 이 약의 경기치료의 유익성을 예상하여 재활을 예상하기 위해 개개의 환자를 별도로 고려된다.

(28) 경기증과 함께: 초기용량으로 1회 10mg을 투여하는 경우의 반응에 따라 1일 최대 20mg으로 증강할 수 있다.

12주 동안 치료를 기록하는 경우에 시도된다. 의사는 각각의 환자들에 있어서 이 약의 경기치료의 유익성을 예상하여 재활을 예상하기 위해 개개의 환자를 별도로 고려된다.

(29) 경기증과 함께: 초기용량으로 1회 10mg을 투여하는 경우의 반응에 따라 1일 최대 20mg으로 증강할 수 있다.

12주 동안 치료를 기록하는 경우에 시도된다. 의사는 각각의 환자들에 있어서 이 약의 경기치료의 유익성을 예상하여 재활을 예상하기 위해 개개의 환자를 별도로 고려된다.

(30) 경기증과 함께: 초기용량으로 1회 10mg을 투여하는 경우의 반응에 따라 1일 최대 20mg으로 증강할 수 있다.

12주 동안 치료를 기록하는 경우에 시도된다. 의사는 각각의 환자들에 있어서 이 약의 경기치료의 유익성을 예상하여 재활을 예상하기 위해 개개의 환자를 별도로 고려된다.

(31) 경기증과 함께: 초기용량으로 1회 10mg을 투여하는 경우의 반응에 따라 1일 최대 20mg으로 증강할 수 있다.

12주 동안 치료를 기록하는 경우에 시도된다. 의사는 각각의 환자들에 있어서 이 약의 경기치료의 유익성을 예상하여 재활을 예상하기 위해 개개의 환자를 별도로 고려된다.

(32) 경기증과 함께: 초기용량으로 1회 10mg을 투여하는 경우의 반응에 따라 1일 최대 20mg으로 증강할 수 있다.

12주 동안 치료를 기록하는 경우에 시도된다. 의사는 각각의 환자들에 있어서 이 약의 경기치료의 유익성을 예상하여 재활을 예상하기 위해 개개의 환자를 별도로 고려된다.

(33) 경기증과 함께: 초기용량으로 1회 10mg을 투여하는 경우의 반응에 따라 1일 최대 20mg으로 증강할 수 있다.

12주 동안 치료를 기록하는 경우에 시도된다. 의사는 각각의 환자들에 있어서 이 약의 경기치료의 유익성을 예상하여 재활을 예상하기 위해 개개의 환자를 별도로 고려된다.

(34) 경기증과 함께: 초기용량으로 1회 10mg을 투여하는 경우의 반응에 따라 1일 최대 20mg으로 증강할 수 있다.

12주 동안 치료를 기록하는 경우에 시도된다. 의사는 각각의 환자들에 있어서 이 약의 경기치료의 유익성을 예상하여 재활을 예상하기 위해 개개의 환자를 별도로 고려된다.

(35) 경기증과 함께: 초기용량으로 1회 10mg을 투여하는 경우의 반응에 따라 1일 최대 20mg으로 증강할 수 있다.

12주 동안 치료를 기록하는 경우에 시도된다. 의사는 각각의 환자들에 있어서 이 약의 경기치료의 유익성을 예상하여 재활을 예상하기 위해 개개의 환자를 별도로 고려된다.

(36) 경기증과 함께: 초기용량으로 1회 10mg을 투여하는 경우의 반응에 따라 1일 최대 20mg으로 증강할 수 있다.

12주 동안 치료를 기록하는 경우에 시도된다. 의사는 각각의 환자들에 있어서 이 약의 경기치료의 유익성을 예상하여 재활을 예상하기 위해 개개의 환자를 별도로 고려된다.

(37) 경기증과 함께: 초기용량으로 1회 10mg을 투여하는 경우의 반응에 따라 1일 최대 20mg으로 증강할 수 있다.

12주 동안 치료를 기록하는 경우에 시도된다. 의사는 각각의 환자들에 있어서 이 약의 경기치료의 유익성을 예상하여 재활을 예상하기 위해 개개의 환자를 별도로 고려된다.

(38) 경기증과 함께: 초기용량으로 1회 10mg을 투여하는 경우의 반응에 따라 1일 최대 20mg으로 증강할 수 있다.

12주 동안 치료를 기록하는 경우에 시도된다. 의사는 각각