

※ 의약품 사용하시기 전에 주의깊게 읽도록하시고 설명서는 의약품과 함께 보관하여 주십시오.  
※ 의약품을 처방된 증상·환자 이외에는 사용하지 말고, 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

# 사데닌 정

(S-Adenosyl-L-methionine Sulfate Tosilate)

전문의약품



## 【원료약품의 분량】 1정 중

- 유효성분 : S-아데노실-L-메티오닌황산토실산염(KP)  
(S-Adenosyl-L-methionine Sulfate Tosilate)  
..... 384.0 mg  
(S-아데노실-L-메티오닌으로서 200mg)

- 첨가제(타르색소) : 황색5호 알루미눔레이크, 황색203호 알루미눔레이크  
- 기타 첨가제 : D-만니톨, 미결정셀룰로오스PH102, 메타아크릴산-아크릴산에틸 공중합체, 산화티탄, 수산화나트륨, 시메티콘에멀전, 시트르산, 스테아르산, 전분글리콜산나트륨, 크로스카멜로스소디움, 콜로이드 성이산화규소, 트리아세틴, 탭크, 폴리에틸렌글리콜400, 히프로멜로오스프탈레이트200731

【성상】 미황색의 원형 장용성 코팅정제

【효능·효과】 우울증

【용법·용량】

### ■ 성인

- 개시요법 : S-아데노실-L-메티오닌으로서 1회 400mg 1일 2~3회 15~30일 간 경구 투여한다.
  - 유지요법 : 1회 200mg 1일 2~3회 경구투여한다.
- 이 약은 씹거나 분쇄하지 말고 그대로 삼켜서 복용해야 한다.

## 【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
  - 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 환자
  - 조현병 환자
  - 양극성장애 환자
  - 소아
  - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
  - 호모시스틴노, 고호모시스테인혈증 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것
  - 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 이상반응
  - 과민반응 : 안면부종, 혀와 후두 내부의 경직, 천식성 호흡곤란, 빈맥(빠른맥), 급격한 혈압강하, 소크가 나타날 수 있다.
  - 소화기계 : 때때로 위장관 불쾌감, 구역, 구토, 경미한 복부통증, 위장관출혈, 드물게

제조판매자

## 조당약품공업(주)

경기도 안산시 단원구 별망로 381

- 변비, 복부팽만감, 소화불량이 나타날 수 있다.
- 3) 피부 : 발진, 가려움, 두드러기가 나타날 수 있다.
- 4) 기타 : 때때로 수면장애, 드물게 구강건조증, 두통, 피로가 나타날 수 있다.
- 4. 일반적 주의
  - 우울증 치료제에 대한 임상 논문들의 메타분석에서, 25세 미만의 연령층에서 위약을 투여한 군보다 자살 행동의 위험이 증가하였다. 65세 이상의 투여 및 이 약의 장기 병용에 대한 충분한 임상 자료는 없다.
  - 5. 임부 및 수유부에 대한 투여
    - 1) 임신 중의 투여에 대한 임상경험이 충분하지 않으므로 투여하지 않는다.
    - 2) 모유 중으로의 이행여부가 알려져 있지 않으므로 투여하지 않는다.
  - 6. 보관 및 취급상의 주의사항  
수송이나 보관중 용기에 금이 가거나 장기 간 열에 노출되어 변색이 된 것은 교환하여 사용하는 것이 바람직하다.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 100정(10정 / Foil × 10)

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한(유효기한)이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 [www.chodang.com](http://www.chodang.com) 또는 전화 : 02-2206-3800에서 확인 할 수 있음.

※ 내용 외 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전처로 연락하시고, 부작용 보고 및 피해구제 신청은 한국 의약품안전관리원(1644-6223) 및 피해구제 제도 전용 상담번호(14-3330)에서 할 수 있습니다.

※ 의약품 용어 설명 및 정보는 "의약품 통합 정보시스템 ([nedrug.mfds.go.kr](http://nedrug.mfds.go.kr))" 의약품 정보 참조

문서작성년월일 : 2001.08.03

문서개정년월일 : 2022.12.08

## 참고 사항

본 제품은 인습성이 강한 제제로서 제제 시에도 호일 포장을 개봉하면 안됩니다.  
"가능한 서늘한곳에 보관하십시오."  
(따뜻한 곳에 두지 말 것)